

L'urgence allergique : le choc anaphylactique

si **5 min** (jusqu'à 1 ou 2h), **après une prise alimentaire,**
l'enfant se sent mal...

1. PLUSIEURS SYMPTOMES = GRAVITE

- . démangeaisons (peau, gorge...)
- . boutons, plaques...
- . toux, voix rauque, hypersalivation, goût bizarre...
- . essoufflement, oppression...
- . oedème (gonflement) visage, gorge, langue...
- . douleurs au ventre, vomissements...
- . malaise général, "ne se sent pas bien", pâleur, inconscience...
- . pulsations cardiaques trop rapides ou saccadées...



2. AGIR VITE, dans les 10 min

- . aller chercher la trousse d'urgence de l'enfant
- . suivre le PAI, le protocole d'urgence
- . utiliser sans hésiter le stylo injecteur d'adrénaline
- . allonger sur le dos (si conscient)
- . ou sur le côté, en PLS (si inconscient)
- . relever les jambes, couvrir l'enfant



**Utiliser l'auto-injecteur trop tôt, ne tue pas.
Ne pas l'utiliser...ou trop tard, si.**

3. PREVENIR

15

- . appeler le **SAMU au 15**
- . signaler une "réaction allergique grave" ou "choc anaphylactique"
- . demander à parler au plus vite au médecin régulateur
- . insister pour que ce soit le Samu qui prenne en charge



*Le plus souvent,
réaction allergique rapide = réaction allergique grave*

N'attendez pas d'avoir des regrets..... AGISSEZ !!!!