

Piano terapeutico di emergenza

Cognome :
Data di nascita :

Nome :
Peso:

Esclusioni alimentari per allergie

-
-
-
-

Farmaci di emergenza :

- antistaminico:
- cortisone per via orale :
- bronco-dilatatore :
- Adrénalina auto-iniettabile :

Da compilare dall' allergologo

**Immediatamente, ai primi sintomi dopo ingestione alimentare,
sdraiare il paziente, gambe sollevate ;
in posizione laterale di sicurezza in caso di vomito
chiamare il pronto soccorso et somministrare:
chiamare i genitori**

situazioni	sintomi	Cosa fare
Nel caso di crisi di asma	- difficoltà respiratoria - impressione di soffocamento - difficoltà per parlare - sibili - tosse	- somministrare l'adrenalina autoiniettabile sul lato anterolaterale della coscia (lasciare in contatto 10 secondi) -poi 2 puff di da ripetere se nessun miglioramento dopo 5 minuti
Nel caso di malaise (malessere) o 2 sintomi generali	Malaise (malessere) con - prurito e/o - difficoltà respiratoria e/o - dolori addominali e/o - nausea, vomito	- somministrare l'adrenalina autoiniettabile sul lato anterolaterale della coscia (lasciare in contatto 10 secondi)
Nel caso di edema/gonfiore	-edema di lingua e/o -soffocamento, cambiamento di voce (voce rauca) ----- - edema non-asfissiante	- somministrare l'adrenalina autoiniettabile sul lato anterolaterale della coscia (lasciare in contatto 10 secondi) ----- - prendere pastiglia di e pastiglie di
Nel caso di crisi di orticaria	- macchie rosse /pomfi con prurito	- prendere pastiglia di e pastiglie di

E sotto la responsabilità dei genitori di controllare la data di scadenza dei farmaci e di rinnovare i farmaci scaduti

Data :

Firma e Timbro del allergologo: